## Estatística e Probabilidades

## Lista 03

## Entrega em 27/08/2020

Para todas as questões, a construção do resultado (através dos cálculos, explicações, comentários, etc.) deve ser apresentada. Respostas sem esse tipo de justificativa **não** serão pontuadas.

A questão de *desafio* vale dois pontos extras na primeira prova (limitado ao valor máximo da avaliação) para o(a) **primeiro(a)** aluno(a) que submeter a solução correta. Por fim, o nível de dificuldade desse tipo de questão **não** será repetido na prova. Fiquem tranquilos!

Exercício 0.1. Mostre que se a variável aleatória X tem distribuição geométrica com parâmetro p; isto é, se  $f_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = (1 - p)^{x-1} p$ , com  $x \in \{1, 2, \dots\}$ , então X tem a propriedade de "perda de memória". Em outras palavas, mostre que  $\mathbb{P}(X > s + t | X > t) = \mathbb{P}(X > s)$ , para s, t números inteiros não-negativos.

Sugestão: Determine  $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$  e veja que  $\mathbb{P}(X > x) = 1 - F_X(x)$ . Para isso, note que a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica com primeiro termo a e razão r é dada por  $S_n(a,r) = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ .

Exercício 0.2. João trabalha com vendas por telefone. A probabilidade de ele conseguir efetuar uma venda em um primeiro contato com o cliente (isto é, de ele ter *sucesso*) é de 0.4. Dado que as ligações são independentes, determine:

- (a) Qual a probabilidade de ele ter tido exatamente 5 fracassos antes de conseguir sua segunda ligação de sucesso?
- (b) Qual a probabilidade de ele ter tido menos que 5 fracassos antes de conseguir sua segunda ligação de sucesso?

**Desafio 0.1** (James, Barry R. *Probabilidade: um curso em nível intermediário*). Um jogador vai lançar uma moeda honesta. Ele para depois de jogar ou duas caras sucessivas ou duas coroas sucessivas. Qual a esperança do número de lançamentos?

Sugestão: Para resolver essa questão, lembre-se de que, sobre séries de potências,

- 1. Se  $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$  tiver raio de convergência r > 0, então  $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n$  é diferenciável em (-r,r) e vale que  $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n \cdot c_n x^{n-1}$ ; e
- 2.  $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ , para |x| < 1.